



Numéro d'article	023000
Prix HT	20,68 €
Prix TTC	25,02 €
Stock	en stock

Description

Allevyn Non-Adhesive est fabriqué à base de polyuréthane hydrocellulaire. Grâce à un procédé de fabrication de haute technologie, on obtient un produit qui assure une absorption maximale et contrôlée de l'exsudat.

Avantages

- Pouvoir d'absorption élevé Des études in vitro et l'expérience clinique ont montré que les pansements Allevyn peuvent rester en place jusqu'à sept jours, selon l'étape de la cicatrisation en cours. Cette capacité tient à plusieurs de leurs caractéristiques :
 - L'interface microperforée, au contact de la plaie, permet le passage d'un exsudat même épais vers l'intérieur du pansement.
 - La couche médiane du pansement absorbe et retient les liquides dans sa mousse hydrocellulaire.

- La face externe perméable à l'air permet l'évaporation de tout excès d'humidité.

Ces propriétés permettent le maintien d'un milieu humide au niveau de la plaie, ce qui favorise la progression rapide de la cicatrisation.

- Non adhérent Les pansements Allevyn ont une interface de polyuréthane qui n'adhère pas au lit de la plaie, quelle qu'elle soit.
- Favorise la cicatrisation La face extérieure rose utilisée pour les pansements Allevyn est un film perméable à l'air et à la vapeur d'eau et imperméable à l'eau et aux bactéries, qui permet la formation et le maintien d'un milieu de cicatrisation humide, et empêche une contamination bactérienne exogène.
- Non adhésif Les pansements Allevyn Non-Adhesive ne sont pas adhésifs et conviennent par conséquent aux plaies dont les berges sont fragiles, comme les ulcères veineux. L'absence d'adhésif nécessite de fixer le pansement avec par exemple, un sparadrap, une bande ou un film transparent comme OpSite.
- Facilité d'utilisation Les pansements Allevyn sont souples et peuvent être découpés pour s'adapter à des plaies de formes diverses et sur différents sites. Dans la mesure où ils absorbent les exsudats, les pansements Allevyn peuvent légèrement gonfler, mais ne laissent pas de débris dans la plaie. Le renouvellement des pansements est, par conséquent, une opération plus facile pour l'infirmier(ère) et non traumatisante pour le patient ; l'irrigation de la plaie n'est en général pas nécessaire. La saturation du pansement par l'exsudat est visible au travers du film extérieur rose.
- Doux et capitonnés Les pansements Allevyn sont doux et épais, offrant un grand confort et une excellente protection aux patients.

Indications

Plaies bourgeonnantes. Toutes plaies chroniques exsudatives.

Contre-indications / Précautions

Aucun pansement de la gamme Allevyn ne doit être utilisé en association avec un oxydant, tel qu'une solution d'hypochlorite ou du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), qui risque de décomposer la mousse de polyuréthane composant l'hydrocellulaire.

Comme sous tout pansement, peuvent survenir des lésions d'irritation de la peau périlésionnelle liées à la macération ou à l'infection. La sensibilisation au pansement est rare. Devant un érythème persistant demander un avis spécialisé.