Pince à tiques HEKA

08/10/2025 11:32:24

Numéro d'article	4101571
Prix HT	4,28 €
Prix TTC	5,18 €
Stock	en stock

Description

Comment enlever une tique?

Toute manipulation peut faire vomir la tique. Vous augmentez ainsi le risque d'infection. Retirez la tique en un seul mouvement avec un tire-tique.

Retirez délicatement la tique en un seul mouvement avec un tire-tique.

- N'essayez pas de faire sortir une tique.
- N'utilisez pas d'alcool, d'iode, de savon, d'éther ou d'huile.
- Ne brûlez pas une tique qui s'est attachée.
- Ne tordez pas une tique.

- Que faut-il faire après une morsure de tique?

Si vous avez retiré une tique, il est important d'assurer un suivi adéquat de la morsure de tique:

Gardez un œil sur les symptômes éventuels pendant un mois. En tant que parent, notez dans votre agenda la date de la piqûre de tique de votre enfant et rappelez-lui chaque semaine de regarder l'endroit où elle a été faite. Le suivi est important pour pouvoir commencer un traitement correct en cas de maladie. Un signe important de la maladie de Lyme est une tache rouge, en forme d'anneau, à l'endroit de la morsure de tique, qui grossit progressivement. Cette tache n'apparaît pas immédiatement, mais après quelques jours ou semaines. Chez les personnes à la peau plus foncée, elle est bleue. Les symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe (fièvre accompagnée de douleurs musculaires et/ou articulaires) peuvent également être le résultat d'une morsure de tique.

Afbeeldingen